

**TABLA 1. Composición, características, indicadores relevados y estructura de la muestra analizada**

| Sitio | Sector | Individuo | Tipo de entierro / Contexto de hallazgo         | Fecha      | Marcas de corte | Termoalteración | Deformación craneana | ICE    | Rasgos epigenéticos  | Edad             | Categoría etaria | Patologías                                       | Contexto de recuperación                      |
|-------|--------|-----------|---|------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------|--|------------------|------------------|--|---|
| PCH   | A      | 1         | entierro primario en fosa                       | 2030±80 AP | Si              | Si              | Si                   | 45.64% | forámen mental   | 1 año±4 meses    | Infantil         | fusión atlanto-occipital y "dens evaginatus"     | Excavación sistemática (Ortiz et al., 2017)   |
| PCH   | A      | 2         | entierro primario en fosa                       |            | No              | Si              | Si                   | 30.21% | oscículo lamboide y foramen mental   | 8 años±1 año     | Juvenil          |  | Excavación sistemática (Ortiz et al., 2015)   |
| PCH   | A      | 3         | calota asociada a entierro de adulto            |            | Si              | Si              | Si                   |        | N/D  | N/D              | N/D              | hiperostosis porótica                            | Excavación sistemática (Ortiz y Nieva, 2014b) |
| PCH   | A      | 4         | paquete óseo                                    |            | N/D             | Si              | Si                   |        | N/D  | 4 años±1 año     | Niño             | hiperostosis porótica                            | Excavación sistemática (Ortiz et al., 2017)   |
| PCH   | A      | 5         | en fogón  | 2030±50 AP | N/D             | Si              | N/O                  |        | N/D  | 6 años±1 año     | Niño             |  | Excavación sistemática (Ortiz y Nieva, 2014b) |
| PCH   | A      | 6         | en fogón  | 2030±50 AP | N/D             | Si              | N/O                  |        | N/D  | 6 años±1 año     | Niño             |  | Excavación sistemática (Ortiz y Nieva, 2014b) |
| PCH   | A      | 7         | sobre piso                                      |            | N/D             | Si              | N/O                  |        | N/D  | 9 años±1 año     | Niño             |  | Excavación sistemática (Ortiz y Nieva, 2014b) |
| PCH   | A      | 8         | sobre piso                                      |            | N/D             | No              | N/O                  |        | N/D  | 1 año±4 meses    | Infantil         |  | Excavación sistemática (Ortiz y Nieva, 2014b) |
| PCH   | B      | 1         | posiblemente primario directo                   |            | N/D             | Si              | N/O                  | 11.30% | N/D  | 5 meses±3 meses  | Infantil         |  | Excavación sistemática (Ortiz et al., 2012)   |
| PCH   | B      | 2         | entierro primario en fosa                       |            | No              | No              | Si                   | 23.68% | sutura metópica abierta, foramen supraorbitario, escotadura supraorbitaria; forámenes infraorbitales múltiples; oscículo lamboide; forámen mastoide; forámen mental; puente mylohioides; apertura septal | 3 años±1 año     | Niño             | fusión atlanto-occipital e hiperostosis porótica | Excavación sistemática (Ortiz et al., 2012)   |
| PCH   | B      | 5         | frag. hueso largo asociado a entierro de adulto |            | No              | No              | N/O                  |        |  | N/D              | N/D              |  | Excavación sistemática (Ortiz et al., 2012)   |
| AN    |        | 1         | entierro primario en fosa                       | 1650±80 AP | Si              | Si              | Si                   | 46.55% | escotadura supraorbitaria; forámen mastoide; forma de la articulación astragalares en el calcáneo  | 4 años±2 años    | Niño             |  | Excavación sistemática (Ortiz, 2014)          |
| AN    |        | 2         | N/D   |            | No              | No              | N/O                  |        |  | 11 años±30 meses | Juvenil          |  | Recolección superficie (Ortiz, 2014)          |
| AC    |        | 1         | N/D   |            | N/D             | No              | N/O                  |        |  | 6 meses±6 meses  | Infantil         |  | Rescate por particulares                      |
| SA    |        | 1         | N/D   |            | No              | No              | Si                   | 29.72% | forámen supraorbitario; hueso apical; oscículo lamboide; oscículo asterion; forámen mastoide; forámen mental y apertura septal   | 7 años±1 año     | Juvenil          |  | Rescate por particulares                      |

PCH: Pozo de la Chola; AN: Aguas Negras; AC: Arroyo Colorado; SA: Santa Ana; ICE: índice de conservación del esqueleto; N/D: no determinado; N/O: No observable; AP: antes del presente.