

CONFIRMACIÓN DE LA PRESENCIA DEL PICAFLOR TIJERETA (*EUPETOMENA MACROURA*) EN ARGENTINA

JUAN CARLOS CHEBEZ¹, RODRIGO CASTILLO², ROBERTO GÜLLER³ Y CARLOS FERRARI⁴

¹ *Fundación de Historia Natural "Félix de Azara", Universidad Maimónides.
Valentin Virasoro 732, C1405BDB Buenos Aires, Argentina.*

² *Fray Luis Beltrán 150, 3370 Puerto Iguazú, Misiones, Argentina.*

³ *Blanco Encalada 5033 5°B, C1431CDM Buenos Aires, Argentina. rmguller@uolsinectis.com.ar*

⁴ *Matheu 2151 1°B, 1249 Buenos Aires, Argentina.*

RESUMEN.— Se confirma con grabaciones de video y fotografías la presencia del Picaflor Tijereta (*Eupetomena macroura*) en la provincia de Misiones, Argentina, en donde su presencia había sido reportada en base a un registro visual.

PALABRAS CLAVE: *Argentina, Eupetomena macroura, Misiones, picaflor.*

ABSTRACT. CONFIRMATION OF THE PRESENCE OF THE SWALLOW-TAILED HUMMINGBIRD (*EUPETOMENA MACROURA*) IN ARGENTINA.— The presence of the Swallow-tailed Hummingbird (*Eupetomena macroura*) has been confirmed in the province of Misiones, Argentina, with photographs and video. Previously its presence had only been recorded by one observation.

KEY WORDS: *Argentina, Eupetomena macroura, hummingbird, Misiones.*

Recibido 8 septiembre 2005, aceptado 30 marzo 2006

El Picaflor Tijereta, *Eupetomena macroura* (Gmelin, 1788) fue citado para Argentina por Saibene et al. (1996) con el siguiente comentario: "Rara. Visitante ocasional. Un ejemplar macho observado por H. Povedano (in litt.) el 22 de julio de 1993 en la Secc. Timbó. Es el primer registro de la Argentina". Esto motivó su mención por Chebez (1996), Chebez et al. (1998), de la Peña (1999), Narosky et al. (2002) y Narosky e Yzurieta (2003), siempre en base al mismo registro. Mazar Barnett y Pearman (2001), teniendo en cuenta que no existía documentación de la especie, la listan como hipotética para la avifauna argentina.

El 10 de enero de 2005, uno de los autores (RC) comenzó a ver en el Jardín de los Picaflor, en Puerto Iguazú (departamento Iguazú, provincia de Misiones), un individuo presuntamente macho joven de esta especie, al que pudo grabar en video y fotografiar, siendo con posterioridad fotografiado por otros observadores de aves. El individuo permaneció rondando los bebederos hasta el 10 de julio de 2005. Durante ese lapso fue avisado por experimentados observadores que corroboraron la determinación.

Esta especie de picaflor se distingue por su tamaño, llegando a los 15–18 cm de longitud total, correspondiendo a la cola unos 7–9 cm y siendo el colibrí más grande del noreste argentino, aventajado en el país solo por el Picaflor Gigante (*Patagona gigas*) y el Picaflor Cometa (*Sappho sparganura*). La cola azul, larga y bien furcada, es un rasgo distintivo peculiar. El pico es negro, largo y ligeramente curvo. Las alas también son negras, la cabeza y el pecho son azul oscuro y el dorso y el vientre verde brillante. La única especie confundible es el Picaflor Corona Violácea (*Thalurania glaucopis*), que, además de ser más pequeño, posee la cola azul furcada pero nunca en la magnitud de esta especie.

La subespecie nominotípica cuenta con registros en los estados brasileños desde "el extremo sur de Bahía por la faja atlántica hasta Río Grande do Sul, inclusive Mato Grosso do Sul, Mato Grosso; Pará, Minas Gerais y Goiás" (Ruschi 1982). Esta subespecie a la que asignamos tentativamente nuestro registro es citada por Schuchmann (1999) para las Guayanas, norte, centro y sudeste de Brasil desde Amapá y Pará, Mato Grosso, Goiás y Minas Gerais a




Figura 1. Picaflor Tijereta (*Eupetomena macroura*) en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. Foto: R Castillo.

Sao Paulo y Paraguay. En Sao Paulo se cita una subespecie peculiar costera, *Eupetomena macroura cyanoviridis*, en la Serra do Mar (Grantsau 1988). En Paraguay fue confirmada su presencia por Hayes (1995) y Guyra Paraguay (2004). En los estados de Brasil vecinos a Misiones cuenta con registros en Paraná (Scherer-Neto y Straube 1995) y con tres registros en el oriente del estado de Santa Catarina (Piraí, Joinville y Blumenau; Rosário 1996), considerándose rara. En Río Grande do Sul cuenta con dos registros del nordeste, de 1956 y 1976, en Porto Alegre y en Sapucaia do Sul, respectivamente (Belton 1994). En Brasil la distribución de esta subespecie es mayormente atlántica o paranaense y del Cerrado, siendo común en claros o bordes de la selva, jardines y capueras, acostumbrando posarse en cables (Sick 1985, Souza 1998).

En cuanto al uso del género monoespecífico *Eupetomena* Gould, 1849-61 para la especie, seguimos el criterio conservador adoptado por Remsen et al. (2005), a pesar de que Schuchmann (1999) la incluyó en el género *Campylopterus* Swainson, 1827 junto con otras tres especies, basándose en similitudes del canto y la morfología alar, que no fueron a nuestro entender claramente demostradas.

Queda confirmada así la presencia del género y la especie en la Argentina y en la provincia de Misiones, y se publican las primeras fotografías de la especie obtenidas en nuestro país (Fig. 1 y 2).

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Norberto Bolzón por su colaboración desinteresada, la familia Castillo por su permanente atención, Germán Pugnali, Alejandro Bodrati, Mark Pearman y Pedro Cristóbal Doiny Cabré por su colaboración; Guillermo Gil y Jacques Vieillard por facilitarnos valiosa bibliografía y a Rosendo Fraga por sus comentarios siempre oportunos. A Rosemary Scofield y Alec Earnshaw por las traducciones. A Silvia Vitale por facilitar material fotográfico.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BELTON W (1994) *Aves do Rio Grande do Sul: distribuição e biologia*. Unisinos, San Leopoldo
- CHEBEZ JC (1996) *Fauna misionera. Catálogo sistemático y zoogeográfico de los vertebrados de la provincia de Misiones (Argentina)*. L.O.L.A., Buenos Aires
- CHEBEZ JC, DI GIACOMO A, REY N Y BABARSKAS M (1998) *Las aves de los parques nacionales de la Argentina*. L.O.L.A., Buenos Aires
- GRANTSAU R (1988) *Os beija-flores do Brasil*. Editora Expressão e Cultura, Río de Janeiro
- GUYRA PARAGUAY (2004) *Lista comentada de las aves de Paraguay*. Guyra Paraguay, Asunción



Figura 2. Picaflor Tijereta (*Eupetomena macroura*) en Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. Foto: S Vitale.

- HAYES F (1995) *Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay*. American Birding Association, Nueva York
- MAZAR BARNETT J Y PEARMAN M (2001) *Lista comentada de las aves argentinas – Annotated checklist of the birds of Argentina*. Lynx Edicions, Barcelona
- NAROSKY T, CHEBEZ JC E YZURIETA D (2002) *Guía para la identificación de las aves de Iguazú*. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires
- NAROSKY T E YZURIETA D (2003) *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición de oro*. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires
- DE LA PEÑA M (1999) *Aves argentinas. Lista y distribución*. L.O.L.A., Buenos Aires
- REMSEN JV JR, JARAMILLO A, NORES M, PACHECO JF, ROBBINS MB, SCHULENBERG TS, STILES FG, DA SILVA JMC, STOTZ DF Y ZIMMER KJ (2005) *A classification of the bird species of South America*. American Ornithologists' Union. URL: <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html>
- ROSÁRIO LA (1996) *As aves en Santa Catarina. Distribuição geografica e meio ambiente*. FATMA, Florianópolis
- RUSCHI A (1982) *Beija-flores do estado do Espírito Santo*. Editora Rios, San Pablo
- SAIBENE C, CASTELINO M, REY N, HERRERA J Y CALO J (1996) *Inventario de las aves del Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina*. L.O.L.A., Buenos Aires
- SCHERER-NETO P Y STRAUBE FC (1995) *Aves do Paraná: historia, lista anotada e bibliografia*. Edición de los autores, Curitiba
- SCHUCHMANN KL (1999) Family Trochilidae (hummingbirds). Pp. 468–680 en: DEL HOYO J, ELLIOT A Y SARGATAL J (eds) *Handbook of the birds of the world. Volume 5. Barn-owls to hummingbirds*. Lynx Edicions, Barcelona
- SICK H (1985) *Ornitología brasileira. Uma introdução*. Editora Universidade de Brasilia, Brasilia
- SOUZA D (1998) *Todas as aves do Brasil. Guía de campo para identificação*. Editora Dall, Salvador