

---

**Liposarcoma retroperitoneal gigante**

---

Mujer de 45 años que consultó por síntomas de distensión abdominal, constipación y pérdida de peso desde seis meses atrás. El examen físico indicó una enorme masa abdominal a la izquierda, palpable y dolorosa. Una radiografía abdominal con bario demostró notable desplazamiento de los intestinos hacia la derecha, que radiográficamente podría sugerir un diagnóstico erróneo de mala rotación intestinal (Fig. 1). Sin embargo, la tomografía computarizada (TC) abdominal reveló una masa retroperitoneal grande, heterogénea, en parte lobulada, con límites poco definidos, con densidad de grasa, que dislocaba la mayoría de los órganos abdominales hacia la derecha (Fig. 2, flechas). El estudio histopatológico post-quirúrgico de las muestras tomadas de la masa confirmó el diagnóstico de liposarcoma retroperitoneal bien diferenciado. Los liposarcomas retroperitoneales son el subtipo más frecuente de los sarcomas retroperitoneales. Aunque estos son tumores poco frecuentes, comprenden un tercio de todas las neoplasias retroperitoneales. El diagnóstico por imágenes, especialmente modalidades como la TC y la resonancia magnética nuclear (RMN), son herramientas diagnósticas útiles, como se muestra en el presente caso.



Giordano R. Tronco Alves<sup>1</sup>, José R. Missel Corrêa<sup>2</sup>,  
Régis V. de Andrade Silva<sup>2</sup>, Carlos J. Pereira Haygert<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Clínica Médica,  
Universidad Federal de Santa María

<sup>2</sup>División Radiología, Universidad Hospital  
de Santa María, Brasil  
e-mail: grtalves@gmail.com