

EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA EVALUATION IN CONTINUA MEDICAL EDUCATION

VOL. 90/04/2009

Rev Argent Dermatol 2009; 90: 243-245.

1) La causa más frecuente de eritema multiforme es:

- a) la infección por *Mycoplasma pneumoniae*
- b) el consumo de medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)
- c) la infección por Virus Herpes Simplex (HSV)
- d) desconocida

2) Qué es lo más utilizado de la planta de aloe vera?

- a) las flores que son rosadas junto con las de la capa intermedia que tiene antraquinonas
- b) lo más utilizado es el mucílago de las hojas
- c) las hojas en sus tres capas interna, media y externa
- d) todas son correctas

3) Respecto de las Metástasis Cutáneas (MC) puede decirse:

- a) si bien no son entidades frecuentes su diagnóstico se ha ido incrementando en los últimos años
- b) como son raras, en caso de presentarse no tienen demasiado valor para el diagnóstico de un tumor interno primitivo
- c) en ciertas ocasiones una MC es la primera o la única manifestación de un cáncer oculto

- d) ninguna de las anteriores es correcta
- e) sólo a) y c) son correctas

4) La papulosis fibrosa blanca del cuello:

- a) tiene mal pronóstico
- b) se ubica exclusivamente en el cuello y es benigna
- c) se asocia con estrías angioides
- d) se asocia con disección de aorta

5) El mecanismo de herencia de la hipoplasia dérmica focal es:

- a) autosómico dominante
- b) autosómico recesivo
- c) ligado a X dominante
- d) ligado a X recesivo
- e) herencia mitocondrial

6) La entidad clínica de eritema multiforme ampollar corresponde a:

- a) el síndrome de Stevens-Johnson
- b) una enfermedad ampollar autoinmune
- c) una infección cutánea diseminada por HSV
- d) una variante infrecuente del eritema multiforme típico

7)Cuál es la sustancia responsable de la acción laxante del aloe vera

- a) las antraquinonas como la barbaloina, isobarbaloina y la aloemodina

- b) el glucomanano
- c) la capa intermedia que contiene latex y antraquinonas
- d) a) y c) son correctas

8) El principal origen de las Metástasis Cutáneas (MC) varía según el género:

- a) en el sexo femenino es la mama
- b) en el sexo masculino es el pulmón
- c) las MC originadas en tumores de tiroides y tumores neuroendócrinos son más raras tanto en el varón como en la mujer
- d) todas las anteriores son correctas
- e) sólo a) y b) son correctas

9) Las características clásicas de la hipoplasia dérmica focal – síndrome de Goltz, incluyen las siguientes excepto:

- a) inmunodeficiencia
- b) lesiones hipopigmentadas en piel
- c) herniación tejido graso
- d) oligodoncia
- e) atrofia dérmica

10)Cuál es la manera más apropiada de confirmar el diagnóstico de EM asociado a HSV?

- a) el análisis de la historia y el examen físico del paciente
- b) estudio histopatológico y virológico de las lesiones
- c) detección de IgG anti-HSV en suero
- d) inmunofluorescencia directa de las lesiones cutáneas

11)Según Azcune y col:

- a) las MC aparecen casi simultáneamente con el tumor primario
- b) la media de demora en la aparición de las MC es 36 meses

- c) la media de demora en la aparición de las MC es 16 meses
- d) en realidad la demora en la aparición de las MC no tiene importancia en el pronóstico
- e) ninguna de las anteriores es correcta

12)Cuál es la acción del glucomanano?

- a) estimula al fibroblasto
- b) interactúa con los receptores del factor de crecimiento del fibroblasto
- c) aumenta la síntesis de colágeno
- d) todas son correctas

13)El gen responsable de la entidad hipoplasia dérmica focal – síndrome de Goltz es:

- a) ELN
- b) PORNC
- c) ATP7A
- d) FBLN5
- e) EDA-A1

14)Cuál sería el mecanismo patogénico del EM asociado a infección por HSV?

- a) la sensibilización y respuesta inmunopatogénica frente a antígenos de HSV expresados en la piel
- b) una infección cutánea diseminada por HSV en pacientes con otra dermatosis subyacente
- c) una reactivación de la infección por HSV fotoagravada
- d) una reacción de hipersensibilidad inmediata frente a la reactivación de HSV

15)Las MC de origen mamario según su forma clínica pueden denominarse:

- a) erisipelatoide o inflamatoria
- b) en coraza
- c) alopécica

- d) la forma alopécica obliga a descartar primitivos de pulmón y riñón
- e) todas las anteriores son correctas

16) Las siguientes afirmaciones de hipoplasia dérmica focal son ciertas, excepto:

- a) es secundario a una displasia generalizada del endodermo

- b) el compromiso óseo es frecuente, se observa hasta en el 80% de los pacientes
- c) el 90% de los casos se reportan en mujeres
- d) la vía de señalización celular Wnt se encuentra directamente afectada
- e) se considera un desorden multisistémico

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA

FUNDADA EL 21 DE AGOSTO DE 1907

MEXICO 1720 - (C1100ACD) BUENOS AIRES - ARGENTINA

TEL.: 4381-2737 - TELEFAX: 4383-1153

E-mail: info@aad.org.ar

BIBLIOTECA - COMPUTACIÓN

M E D L I N E

MEDLINE, la base de datos bibliográficos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, constituye la mejor fuente de información sobre literatura biomédica.

Contiene referencias de artículos de más de 3200 revistas especializadas en el área médica incluyendo temas como microbiología, nutrición, farmacología y salud ambiental.

La información de esta base de datos se actualiza mensualmente.

SE ESTÁ TRABAJANDO PARA SU RELANZAMIENTO